Streptococcus del grupo B o streptococcus agalactiae.

Estimado paciente:

Su médico ha solicitado un examen para **detectar la bacteria Streptococcus del grupo B** (o Streptococcus agalactiae). Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas adecuadas a su condición.

En mujeres embarazadas, este examen se solicita generalmente entre las semanas 35 y 37 de embarazo o según indicación médica, tomándose muestra de **secreción vaginal y otra desde la zona perianal.**

Para garantizar una muestra de calidad, es importante que lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de proceder con la unidad de toma de muestras.

Instrucciones:

1. El día del examen, **no realizar aseo genital externo** para asegurar la obtención de una muestra que facilite la correcta detección de la bacteria.
2. Evitar el uso de óvulos vaginales, talcos, cremas o colonias en la zona genital durante las 48 horas previas al examen.
3. No realizar ecografía transvaginal en las 48 horas anteriores a la toma de la muestra.
4. Se recomienda evacuar la vejiga antes de la toma del examen para mayor comodidad durante el procedimiento.

Si tiene dudas respecto de este informativo consulte al personal de la unidad de toma de muestras. Eventualmente consulte a nuestro **Call center 323323600**, al correo **consultas@aclin.cl** o en la sección contacto en nuestra web: **www.aclin.cl**

Revisado por Q.F. Marcelo Tapia C.

Marcelo Tapia Carrère
QF / Director Técnico

Este documento no puede ser reproducido ni entregado a terceros, sin la expresa autorización del Director Técnico de Aclin.